



Realização:



Apoio:



**XVII CIC  
X ENPOS**

Conhecimento sem fronteiras  
XVII Congresso de Iniciação Científica  
X Encontro de Pós-Graduação  
11, 12, 13 e 14 de novembro de 2008

## **ANÁLISE DO ATENDIMENTO REALIZADO NA UNIDADE DE CIRURIA BUCO-MAXILAR I (UCBM I) DA FO-UFPel**

**Autor(es):** ROCKENBACH, Patrícia Auth; Kaiser, Karen Martins; Silva, Anna Tellechea

**Apresentador:** Patrícia Auth Rockenbach

**Orientador:** Maurício Assunção Pereira

**Revisor 1:** Josue Martos

**Revisor 2:** Cristina Braga Xavier

**Instituição:** Universidade Federal de Pelotas

### **Resumo:**

A exodontia, dentre as atividades executadas pelos odontólogos, representa uma prática invasiva, de alta complexidade técnica-científica e de alta ocorrência. Em regiões ou países onde uma proporção significativa da população não tem acesso regular às ações de promoção de saúde bucal e aos serviços odontológicos, o tratamento de dentes cariados em estágio avançado é realizado através de exodontias. No Brasil, a perda do órgão dental relacionado com as exodontias provocadas por doenças evitáveis, dentre elas, a cárie dentária e a doença periodontal, é muito elevada. O objetivo do presente trabalho é identificar os acidentes e complicações mais frequentes em exodontias simples dos pacientes atendidos na Unidade de Cirurgia Buco-Maxilar I (UCBM-I) da Faculdade de Odontologia da UFPel. Utilizou-se como método a aplicação de questionários aos pacientes atendidos durante o 2º semestre letivo de 2006. Dados relativos ao sexo, idade, dentes extraídos, acidentes e complicações ocorridas e indicações de exodontias foram coletados e analisados. Os resultados encontrados no universo de 251 pacientes apontam para maioria do sexo feminino (57%), com idade entre 19 e 64 anos (81%). Um total de 309 exodontias foram realizadas, levando a média de 1,2 dentes extraídos por paciente. As principais indicações para as exodontias realizadas foram: raiz residual (32%), lesão cariada extensa (26%) e periodontite (15%). Várias são as causas relacionadas a exodontia, a cárie dentária constitui a principal, exceto na faixa etária acima de 64 anos, onde a doença periodontal é a principal causa. Como acidentes no trans-operatório, a fratura de ápice ocorreu em 8 casos e a comunicação buco-sinusal apenas em 1 caso. Em 2 casos observou-se alveolite como complicação no pós-operatório e um paciente apresentou hemorragia tardia. Assim, a procura por exodontias deve-se principalmente a necessidade de eliminar focos sépticos residuais e o baixo índice de complicações encontradas estão em níveis plenamente satisfatórios denotando o bom funcionamento da clínica avaliada.